

Schemi di profilassi antimalarica per tipo di zone a rischio

Zona	Profilassi	Farmaco	Dosaggio	Inizio	Fine
Tipo A	Repellenti insetti	Contenenti DEET o Icaridina		Ingresso area endemica, soprattutto la notte	Uscita area endemica
Tipo B	Repellenti insetti + Clorochina	Contenenti DEET o Icaridina <i>Clorochina Difosfato 250mg</i>	2 compresse 1 volta a settimana	1 settimana prima dell'ingresso in area endemica	4 settimane dopo l'uscita dall'area malarica
Tipo C	Repellenti insetti + Profilassi Tipo D	Contenenti DEET o Icaridina			
Tipo D	Repellenti insetti + Atovaquone /Proguanil o in alternativa: - Meflochina oppure: - Doxiciclina	Contenenti DEET o Icaridina <i>Malarone ® 250+100mg</i> <i>Larium ® 250mg</i> <i>Bassado ® 100mg</i>	1 compressa 1 volta al giorno 1 compressa 1 volta a settimana 10 giorni prima dell'ingresso in area endemica 1 compressa 1 volta al giorno	Ingresso area endemica, soprattutto la notte 2 giorni prima dell'ingresso in area endemica 10 giorni prima dell'ingresso in area endemica 1 giorno prima dell'ingresso in area endemica	Uscita area endemica 7 giorni dopo l'uscita dall'area malarica 4 settimane dopo l'uscita dall'area malarica 4 settimane dopo l'uscita dall'area malarica